

Sammanfattning av sjukdomsförlopp och behandling

När man fått behandling för testikelcancer kan det efter lång tid dyka upp seneffekter av den givna behandlingen. Dessa seneffekter kan till exempel vara brist på manligt könshormon (testosteron), nedsatt fruktsamhet (fertilitet) samt påverkan på njurar.

Behandlingen kan även ge en liten ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Detta kan yttra sig som förhöjt blodtryck, kärlkramp och förhöjda blodfetter, och du bör avstå från rökning och också försöka undvika övervikt.

Det är bra att du vid kontakter med läkare i framtiden nämner att du varit behandlad för testikelcancer, och denna lapp med information om din genomgångna behandling kan vara till hjälp för dig att komma ihåg.

Namn _____ Personnummer _____

Du opererades år _____ för testikelcancer av typen:

☐ Seminom

☐ Icke-seminom

☐ Biopsiprov togs även från den friska testikeln

☐ Ingen spridning konstaterades

☐ Spridning konstaterades till _____, _____, _____

Kompletterande behandling:

☐ Ingen

☐ Cytostatika (totalt antal behandlingar _____)

☐ Strålbehandling

☐ Kirurgi (förutom operation av den sjuka testikeln) _____, _____

Återfall under uppföljningsperioden:

☐ Nej

☐ Ja, år _____

Sista kontrollen gjordes: datum _____ Sjukhus _____

Behandlande läkare _____ Telefon _____

Tag gärna med denna informationslapp vid kontakt med sjukvården i framtiden.